

Les patients sous anticoagulants oraux  
savent-ils qu'ils ont un anticoagulant ?  
Etude Cacao / phase 1


Marion Gousseland, Paul Frappé

*Paris, 27 mars 2015*



# 2009: Arrivée des AOD

► Diffusion croissante



ANSM, Avril 2014.

# Anticoagulants et iatrogénie

## ▶ AVK

- ▶ 1<sup>ère</sup> cause d'accidents iatrogènes graves
- ▶ 17 000 hospitalisations/an

## ▶ AOD

- ▶ Plus d'hémorragies gastro-intestinales, moins d'hémorragies intracrâniennes
- ▶ Absence d'antidote

# Un nouvel enjeu pour l'éducation thérapeutique

- ▶ Pas de surveillance biologique de la coagulation
- ▶ Pas d'ajustement de dose
- ▶ Pas de consigne alimentaire
- ▶ Le carnet patient suffit-il ?



The image shows a patient information card for oral anticoagulants. The top section has a pink background with the text 'Vous et VOTRE NOUVEAU TRAITEMENT anticoagulant' and lists 'Eliquis®, Pradaxa®, Xarelto®'. Below this is a white section with a form for patient and doctor information.

Vous et VOTRE NOUVEAU TRAITEMENT  
anticoagulant  
Eliquis®, Pradaxa®, Xarelto®

Carnet-conseils appartenant à : .....

Adresse : .....

Tel : .....

Médecin Généraliste : ..... Médecin Spécialiste : .....

Adresse : ..... Adresse : .....

Tel : ..... Tel : .....

# Objectif

- ▶ Comparer le nombre de patients qui ont conscience de prendre un traitement anticoagulant entre les patients sous AVK et ceux sous AOD.

# Matériel et méthodes

- ▶ Étude ancillaire de l'étude CACAO / Phase 1
  - ▶ Etude transversale nationale
  - ▶ Objectif: décrire le profil des patients sous anticoagulants oraux suivis en médecine générale
  - ▶ Pendant 3 mois, inclusion de tous les patients majeurs sous anticoagulants oraux, quel que soit leur motif de consultation
  - ▶ ClinicalTrials.gov: NCT02376777
  - ▶ 463 médecins généralistes investigateurs
  - ▶ 7154 patients inclus

# Matériel et méthodes

- ▶ Question posée à tout patient avant son inclusion

*« J'ai une question à vous poser pour une étude,  
je la pose à tous mes patients.*

*Pouvez-vous me dire si parmi vos traitements,  
il y a un anticoagulant ? »*

→ Oui / Non / Ne sait pas

- ▶ Critère de jugement
  - ▶ Taux de réponses négatives  
lorsque la question a pu être posée

# Résultats

## ▶ Echantillon

- ▶ 7154 patients
- ▶ 5699 AVK (79,7%), 1455 AOD (20,3%)
- ▶ 3847 hommes (53,8%), 75 ans (+/-12)
- ▶ Durée envisagée > 12 mois : 6311 patients (94,5%)



# Résultats

► 7 079 patients (99,0%)

	AVK		AOD		Total		p
	n	%	n	%	n	%	
Connaissance ttt anticoagulant							
Oui	5083	90,1	1248	86,8	6331	89,4	< 0,0001
Non	131	2,3	70	4,9	201	2,8	
Ne sait pas	428	7,6	119	8,3	547	7,7	

# Discussion

- ▶ Pas d'autres données retrouvées dans la littérature
- ▶ Interrogation du patient
  - ▶ Question standardisée
  - ▶ Environnement non maîtrisé
  - ▶ Pas d'exploration réelle des connaissances du patient
- ▶ Points forts de l'étude
  - ▶ Conditions réelles
  - ▶ Dimension nationale
  - ▶ Puissance

# En conclusion

- ▶ Les patients sous AOD sont moins nombreux à savoir qu'ils ont un anticoagulant
  - ▶ 1 sur 20 dit ne pas avoir d'anticoagulant
  - ▶ Soit deux fois plus que sous AVK
  
- ▶ Informons nos patients !

# Merci de votre attention

▶ MERCI à tous les investigateurs et aux responsables de groupes

▶ Plus d'information

- [info@etudecacao.fr](mailto:info@etudecacao.fr)
- [www.etudecacao.fr](http://www.etudecacao.fr)



▶ Etude promue par **CNGE IRMG ASSOCIATION**

et financée par deux programmes de DPC

▶ Liens d'intérêts

- Marion Gousseland : aucun
- Paul Frappé : DPI disponible sur [www.cnge.fr](http://www.cnge.fr)